

	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu <i>ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań</i>	F13-U	
		Wydanie 1	Strona 1 z 1
POBIERANIE PLWOCINY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH INFORMACJE DLA PACJENTA			LA 1.1

***W trosce o dobro i satysfakcję pacjentów przygotowaliśmy informacje, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z ulotką.***

PLWOCINA

Plwocinę pobiera się w celu diagnostyki zakażeń dolnych dróg oddechowych.

Zasady prawidłowego pobierania plwociny do badań mikrobiologicznych:

1. Wieczorem, w dniu poprzedzającym pobranie plwociny, usuń z jamy ustnej wszystkie ruchome protezy.
2. Materiał pobierz rano, na czczo.
3. Rano, w dniu pobrania plwociny, dokładnie umyj jamę ustną: zęby, język i policzki.
4. Wypłucz gardło przegotowaną wodą.
5. Nie pal papierosów.
6. Otwórz jałowy pojemnik z szeroką szyjką nie dotykając wewnętrznych powierzchni pojemnika i nakrętki.
7. Odkrztuś plwocinę bezpośrednio do jałowego pojemnika Nie zbieraj śliny, która nie nadaje się do badań! (Przy trudnościach z odkrztuszaniem należy zastosować oklepywanie klatki piersiowej bezpośrednio przed pobraniem plwociny lub 1-2 dni przed pobraniem plwociny stosować środki wykrztuśne).
8. Zamknij szczelnie pojemnik.
9. Wpisz na pojemniku swoje imię i nazwisko, rodzaj materiału (plwocina) oraz datę i godzinę pobrania materiału.
10. Próbkę plwociny dostarcz w ciągu 2 godzin do laboratorium mikrobiologicznego.