



Informacja dla pacjenta Badania immunohematologiczne u kobiet w ciąży

LA 1
LA 5

Schemat proponowanych badań:

- Do 10 tygodnia ciąży u wszystkich kobiet – oznaczenie grupy krwi (jeżeli nie było wcześniej wykonane) i badanie alloprzeciwciał odpornościowych (przeciwciała odpornościowe skierowane do antygenów krwinki czerwonej),
- 21 - 26 tydzień ciąży – oznaczenie alloprzeciwciał odpornościowych u kobiet Rh D ujemnych,
- Do 28 tygodnia ciąży u wszystkich kobiet badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinki czerwonej,
- 27 - 32 tydzień ciąży u kobiet RhD ujemnych wykrywanie przeciwciał anty-RhD (w celu kwalifikacji do śródciążowej immunoprofilaktyki konfliktu anty-RhD) oraz przeciwciał do antygenów innych układów występujących na krwince czerwonej.

W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych są one identyfikowane, a badania są powtarzane do końca ciąży zgodnie z zaleceniem lekarza lub

- do 20 tygodnia ciąży co 4 tygodnie,
- powyżej 20 tygodnia ciąży co 3 tygodnie.

Wykrycie przeciwciał jest również wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki wewnątrzmacicznej i choroby hemolitycznej płodu/ noworodka. Należy się wówczas udać do **Poradni Patologii Ciąży**.

Lekarz może uznać za konieczne wykonanie badania USG oraz badania dopplerowskiego z oceną przepływu w tętnicy środkowej mózgu płodu.